

**2017학년도
아주대학교 편입학 수강능력시험**

간호학 A형



성명	
전형	
수험번호	

1. 대상자의 간호요구를 사정하고 간호 활동의 우선순위를 결정하는데 지침으로 적용할 수 있는 이론으로 적합한 것은?
 - ① Roy의 적응이론
 - ② Maslow의 욕구단계 이론
 - ③ Rogers의 통합된 인간이론
 - ④ Nightingale의 환경간호 모델
 - ⑤ Gordon의 기능적 건강반응 패턴

2. 간호과정 중 평가의 의의를 가장 올바르게 진술하고 있는 것은?
 - ① 간호사와 의료진간의 협력관계를 촉진한다.
 - ② 간호진단에 필요한 포괄적 사정을 증진한다.
 - ③ 대상자 요구에 대한 정확한 진단을 제공한다.
 - ④ 대상자에게 최적의 간호가 제공되도록 허용한다.
 - ⑤ 현실적인 대상자 중심의 성과를 선택하도록 촉진한다.

3. [항응고 요법과 관련된 출혈의 위험]으로 진단받은 대상자의 특성으로 적절한 내용은?
 - ① “너무 아파요“
 - ② 노란색의 기도 분비물
 - ③ 면담 시 피곤한 모습
 - ④ 키 176cm, 몸무게 56kg
 - ⑤ 주기적 헤모글로빈(Hb) 모니터링 결과

4. 침상안정 중인 대상자에게 [침상안정과 관련된 피부손상 위험성]이라는 간호진단이 내려졌다. 다음의 간호중재 중 간호진단의 원인 부분에서 도출된 것은?
 - ① 매일 아침 침상목욕 실시
 - ② 매 두 시간마다 체위변경
 - ③ 필요할 때마다 등 마사지 제공
 - ④ 욕창 전담간호사에게 평가 의뢰
 - ⑤ 매 식사마다 고단백식이 선택

5. 다음의 간호진단 중 가장 우선순위가 높은 간호진단은?
 - ① 통증
 - ② 수면양상 장애
 - ③ 보호자 부담감
 - ④ 비효율적 기도 청결
 - ⑤ 질병에 대한 지식부족

6. 환자가 알약이 너무 커서 삼키기가 어렵다고 거절하였다. 다음 중 비판적으로 사고하는 간호사의 행동으로 적합한 것은?
- ① 수간호사에게 어떻게 해야 할지 질문한다.
 - ② 다른 간호사에게 부탁하여 약을 복용하도록 한다.
 - ③ 보호자에게 환자의 협조를 구하는 방법을 질문한다.
 - ④ 이번 한번은 약 복용을 건너뛰고 그 이유를 기록으로 남긴다.
 - ⑤ 같은 약을 물약 형태로 줄 수 있는지 약국에 알아본다.
7. 간호실무표준의 [진단] 단계는 “진단이나 중요 문제를 결정하기 위해 사정자료를 분석”하도록 하고 있다. 다음 중 표준을 잘 지키고 있는 간호사는?
- ① 대상자의 혈압이 160/90mmHg로 측정되어 ‘고혈압과 관련된 급성 통증: 두통’으로 진단 내렸다.
 - ② 수면장애를 호소하는 대상자의 문제를 진단하기 위해 대상자의 입원 전 수면양상을 사정하였다.
 - ③ 수술이 예정되어 있어 불안감을 호소하는 대상자에게 ‘지지체계 부족과 관련된 불안감’을 진단 내렸다.
 - ④ 배뇨곤란을 호소하는 대상자의 문제를 진단하기 위해 대상자의 식단구성을 사정 하였다.
 - ⑤ 오심으로 인해 식사를 빨리 먹지 못하는 대상자에게 ‘섭취량 부족과 관련된 영양 불균형 : 영양부족’을 진단 내렸다.
8. 대상자에게 간호과정을 적용할 때 간호사는 건강문제뿐 아니라 강점을 확인해야 한다. 여러 개월 동안 가래 섞인 기침을 주 호소로 입원한 대상자를 간호할 때 강점으로 활용할 수 있는 것은?
- ① 채식을 즐김
 - ② 흡연 경험 없음
 - ③ 약간의 체온상승
 - ④ 고혈압의 가족력 없음
 - ⑤ 체중에 비해 말라 보임
9. 폐경으로 진행되는 과정에서 나타나는 신체반응의 순서로 옳은 것은?
- ① 월경중단-질 위축-골다공증-안면 홍조
 - ② 안면 홍조-월경 중단-질 위축-골다공증
 - ③ 질 위축-골다공증-월경 중단-안면 홍조
 - ④ 안면 홍조-질 위축-월경 중단-골다공증
 - ⑤ 위 네 가지 신체적 반응이 순서가 없이 나타난다.

10. 활동성 결핵이지만 약물투여로 증상이 나타나지 않는 청소년기 대상자의 경우 다음 간호중재로 옳은 것은?
- ① 침상안정
 - ② 호흡기 격리
 - ③ 최적의 영양상태유지
 - ④ 최저의 신체활동
 - ⑤ 투약중지
11. 아동의 척추 측만증 발견을 위한 신체검진 자세로 옳은 것은?
- ① 허리를 왼쪽, 오른쪽 교대로 굽힌다.
 - ② 마주보고 똑바로 선 자세에서 양쪽 팔을 머리 위로 든다.
 - ③ 똑바로 선 자세에서 양팔을 편안히 늘어뜨린 채 허리를 앞으로 구부린다.
 - ④ 서로 등지고 서서 양팔을 머리위로 든다.
 - ⑤ 허리 앞으로 구부리고 양손을 머리 위로 올린다.
12. 당뇨병 환자 교육에 관한 기술 중 Bloom이 제시한 종합적 수준으로 설정된 목표로 옳은 것은?
- ① 인슐린 주사 후 혈당치를 기록한다.
 - ② 일상생활과정에서 혈당치의 변화가 있다는 것을 안다.
 - ③ 혈당치가 높아졌을 때 어떠한 증상이 일어나는지 설명한다.
 - ④ 평소 자신이 실천해야할 식이, 운동, 활동 등에 대해 계획한다.
 - ⑤ 식이, 운동, 활동계획에 관한 실천과 혈당치의 변화를 평가한다.
13. 세계보건기구가 제시한 건강증진을 위한 주요원칙으로 옳은 것은?
- ① 특정질환 위험이 있는 인구집단에 중점을 두어야 한다.
 - ② 건강결정요인을 환경적 요인보다 개인차원에 초점을 두어야 한다.
 - ③ 건강과 사회분야에서 기본적 활동보다 특별활동으로 계획되어야 한다.
 - ④ 의사소통과 교육, 지역사회 자발적인 활동과 같은 다양한 방법으로 구성해야 한다.
 - ⑤ 지역사회 주민들의 자발적인 참여보다 국가의 조직적인 건강증진 사업 전개가 우선 되어야 한다.
14. 치료적 관계의 초기단계에서 간호사가 가장 먼저 해야 할 과업으로 옳은 것은?
- ① 신뢰적이고 수용적인 관계를 수립한다.
 - ② 대상자의 스트레스와 대처자원을 분석한다.
 - ③ 대상자의 저항행위를 분석한다.
 - ④ 간호사의 내면상태를 분석한다.
 - ⑤ 대상자의 행동변화에 있어서 장애요인을 확인한다.

15. 위기의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위기는 예방이 가능하다.
- ② 위기상태는 보통 2~3주간 지속된다.
- ③ 위기는 위협에 직면하여 대처기전을 활성화한다.
- ④ 위기는 기능수준이 저하되어 해체상태에 이르게 한다.
- ⑤ 위기는 정서적인 항상성을 유지하는데 어려움을 느끼게 한다.

16. 치매환자의 간호계획에 기본적으로 포함되어야 할 사항은?

- ① 집단치료에 참여시켜서 사회화를 돕는다.
- ② 현실과 접촉하도록 현재의 사건에 대해 논의한다.
- ③ 젊은 시절과 어린 시절의 경험을 얘기하도록 한다.
- ④ 환자에게 익숙한 규칙적인 일상생활을 유지시킨다.
- ⑤ 사회활동에 참여하도록 새로운 사회적 기술을 훈련시킨다.

17. 환자의 권리 중 하나인 자기결정권을 보호하기 위한 간호사의 의무는?

- ① 주의 의무
- ② 확인 의무
- ③ 설명 및 동의 의무
- ④ 비밀누설 금지 의무
- ⑤ 상담과 조정을 신청할 의무

18. 포괄수가제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 진료행위별로 상대가치 점수매기는 제도
- ② 질병군에 따라 1인당 1일 평균비용을 지급하는 제도
- ③ 질병군에 따라 미리 책정된 정액 진료비를 지급하는 제도
- ④ 환자 당 진료행위료, 약대, 진료재료대 등을 산정하는 제도
- ⑤ 질병군에 따라 직접 간호비와 간접 진료비를 산정하여 비용을 산출하는 제도

19. 대상자의 호흡양상에 상관없이 정확한 농도의 산소공급을 보장하여 만성폐쇄성 폐질환자에게 저농도의 산소를 공급하고자 할 때 산소공급 체계로서 옳은 것은?

- ① 안면 텐트
- ② 단순 마스크
- ③ 비강 캐놀라
- ④ 벤츄리 마스크
- ⑤ 비재호흡 마스크

20. 오른쪽 신체가 쇠약한 대상자의 간호진단 중 Maslow의 요구 계층에 따라 우선순위를 정한 것은?

- 가. 오른쪽 팔의 기능 상실과 관련된 음식섭취 자가 간호 결핍
- 나. 오른쪽 신체의 감각결손과 관련된 피부통합성 장애의 위험
- 다. 오른쪽 팔의 가동성 손상과 관련된 상황적 자존감 저하
- 라. 오른쪽 신체의 기능상실과 관련된 사회적 고립감

- ① 가-나-다-라
- ② 가-나-라-다
- ③ 가-라-나-다
- ④ 가-다-나-라
- ⑤ 가-다-라-나

21. 표준 예방조치(standard precautions)에 부가해서 MRSA에 의해 감염된 대상자를 간호할 때 적용하여야 할 예방법은?

- ① 장의 예방조치
- ② 전반적 예방조치
- ③ 비말 전파 예방조치
- ④ 접촉 전파 예방조치
- ⑤ 공기 전파 예방조치

22. 각 약물에 대한 투약 전 사정해야 하는 내용으로 옳은 것은?

- ① Digoxin - 호흡수를 확인한다.
- ② Morphine - 맥박수를 측정한다.
- ③ Coumadin - 응고시간을 확인한다.
- ④ Heparin - 혈색소 수치를 확인한다.
- ⑤ Furosemide - 혈청칼슘 농도를 측정한다.

23. 57세 대상자의 혈액검사 결과가 아래와 같다. 우선 되어야 할 간호진단은?

[WBC 10,800/mm³, Hb 11.2g/dL, 혈소판 100,000/mm³, 호중구 4%, 임파구 94%, 단핵구 1%, 호산구 1%]

- ① 호중구 감소와 관련된 감염 위험성
- ② 백혈구 증가와 관련된 손상 위험성
- ③ 혈소판 감소와 관련된 출혈 위험성
- ④ 빈혈과 관련된 조직관류 저하 위험성
- ⑤ 임파구 증가와 관련된 손상 위험성

24. 부정맥에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 동성빈맥 시 분당 심박동 수는 150~200회/분이다.
- ② 2도 방실블록에서 P파와 상관없이 QRS가 나타난다.
- ③ 심실세동은 digitalis 중독증에서도 나타난다.
- ④ 방실결절 전도장애시 P파의 이상파형이 나타난다.
- ⑤ 동성서맥 시 R-R간격이 점차 길어진다.

25. 수혈 시 합병증을 예방하는 간호로 옳은 것은?

- ① 알레르기반응 - 수혈 전 스테로이드제를 투여한다.
- ② 순환과잉부담 - 수혈속도를 조절하고 이뇨제를 투여한다.
- ③ 용혈반응 - 수혈속도를 조절하고 혈액을 따뜻하게 한다.
- ④ 세균감염 - 수혈 전 혈액 내 공기나 색깔 변화를 살핀다.
- ⑤ 발열반응 - 흔히 나타나는 반응이므로 속도를 줄여 수혈을 계속한다.

26. 스테로이드 약물요법으로 인해 발생할 수 있는 건강문제와 관련하여 교육해야 할 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 식욕이 감소되므로 열량증가를 위해 고열량 식이를 권장한다.
- ② 감염증상이 덜 심하게 나타나므로 항생제 투여는 필요 없다.
- ③ 단백질 고갈로 인한 골다공증 및 체중감소가 나타난다.
- ④ 혈청 칼륨치가 증가하므로 칼륨이 적게 포함된 음식을 섭취하도록 한다.
- ⑤ 소화성 궤양을 유발할 수 있으므로 식사는 자주 조금씩 먹고 필요시 제산제를 복용한다.

27. 제 1형 당뇨병의 합병증인 당뇨병성 케톤산증 (diabetic ketoacidosis)의 우선되는 간호중재로 가장 적절한 것은?

- ① KCL이 포함된 수액을 3L 이상 주입한다.
- ② 치료적 안정을 도모한다.
- ③ 속효성 인슐린을 소량씩 계속 정맥 주입한다.
- ④ 지속성 인슐린을 정맥 주입한다.
- ⑤ 3~4L의 생리식염수를 정맥 주입한다.

28. 노화에 따른 소화기계의 변화를 올바르게 설명하고 있는 것은?

- ① 간의 크기가 감소되고 약물과 호르몬의 대사 능력이 감소된다.
- ② 소장 소화효소 분비가 감소되며 운동성이 현저하게 감소한다.
- ③ 식도의 평활근이 위축되며 하부식도괄약근의 수축과 경련이 발생한다.
- ④ 위점막의 혈류감소로 염산 분비가 과다하게 발생되어 설사가 유발된다.
- ⑤ 췌장은 가장 영향을 받지 않은 장기로 당내성은 정상기능을 유지한다.

29. 호흡곤란, 무기력, 비정상적인 동맥혈가스분압, 청색증, 얇고 빠른 호흡, 수포음을 나타내는 만성폐쇄성 폐질환 환자에 대한 간호진단 중 가장 먼저 해야 할 중재는?
- ① 환기-관류 불균형과 관련된 가스교환 장애
 - ② 기도 내 분비물의 축적과 관련된 기도개방 유지 불능
 - ③ 산소공급 및 수요의 불균형과 관련된 활동내구성 장애
 - ④ 호흡기능의 변화와 관련된 호흡기도의 감염
 - ⑤ 폐확장 감소와 관련된 비효율적인 호흡양상
30. 다음 중 심부전 환자의 약물치료의 목적으로 올바른 것은?
- ① 관상동맥의 혈관 확장을 위해 nifedipine을 투여한다.
 - ② 소변 배설량 증가로 호흡곤란 감소를 위해 captopril을 투여한다.
 - ③ 심실의 펌프작용을 증진시키기 위해 nitroglycerin을 투여한다.
 - ④ 정맥이완을 위해서 diuril을 투여한다.
 - ⑤ 전신혈관저항 감소를 위해 digitalis를 투여한다.
31. 사구체 신염의 간호중재로 가장 적절한 것은?
- ① 연쇄상 구균이 발견되더라도 신기능 유지를 위해 항생제 사용은 보류한다.
 - ② 면역장애로도 발병하므로 면역억제제와 corticosteroids를 투여한다.
 - ③ 급성기에 일시적인 혈액투석을 하더라도 사회활동을 유지한다.
 - ④ 소변량이 감소하면 탈수를 의미하므로 수분섭취를 증가시킨다.
 - ⑤ BUN 상승은 질병 때문이므로 단백질 섭취를 제한할 필요는 없다.
32. 말기 신부전 환자의 간호중재에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 빈혈이 심하므로 주기적인 수혈을 실시한다.
 - ② BUN/Cr 수치가 높으므로 단백질은 100mg/day로 제한한다.
 - ③ 단백질 분해를 막기 위해 고열량, 고탄수화물 식이를 섭취해야 한다.
 - ④ 포타슘이 많이 함유되어 있는 바나나, 토마토의 섭취를 제한한다.
 - ⑤ 음성질소균형이 일어나지 않도록 식물성식품을 통한 단백질 섭취를 권장한다.
33. 심부전으로 입원 중인 대상자에게 Digoxin과 Chlorothiazide가 처방되었다. 이 대상자에게 적합한 음식은?
- ① 바나나, 오렌지 주스, 시금치
 - ② 탈지분유, 토마토, 식빵
 - ③ 옥수수, 당근, 야채스프
 - ④ 우유, 계란, 생선
 - ⑤ 쇠간, 멸치, 미역

34. 영구적인 인공 심박동기를 적용해야 할 대상자로 옳은 것은?

- ① 분당 심박수가 40회인 대상자
- ② 청색증을 동반한 3도 방실블록 대상자
- ③ 심정지 후 심실수축부전이 나타난 대상자
- ④ 급성 심근경색증 대상자로 전도장애가 있는 대상자
- ⑤ 분당 3~4회의 심실 조기수축을 보이는 대상자

35. 성인 대상자가 치골결합 부위에 압박감을 느끼며 8시간동안 소변배설을 하지 못하고 있다. 식은땀을 흘리며 배꼽 부위에서 둔탁음이 들리고 압통을 호소한다면 가장 적합한 간호문제는?

- ① 요정체
- ② 요실금
- ③ 긴박뇨
- ④ 찜뇨
- ⑤ 요로감염

36. 섭식장애의 원인과 관련된 신경전달물질로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 세로토닌, GABA
- ② 세로토닌, 노르에피네프린
- ③ 노르에피네프린, GABA
- ④ 아세틸콜린, 세로토닌
- ⑤ 아세틸콜린, 노르에피네프린

37. 임신 중 생리적 빈혈의 가장 큰 원인은?

- ① 임신 중 철분섭취의 부족 때문이다.
- ② 적혈구 수치가 감소되기 때문이다.
- ③ 임신 중에는 적혈구와 혈장의 양이 감소되기 때문이다.
- ④ 적혈구 증가량보다 혈장의 증가량이 더 많기 때문이다.
- ⑤ 임신 중 적혈구는 증가하지 않고 혈장량만 증가하기 때문이다.

38. 심내막염과 관련된 다음 내용 중 올바른 것은?

- ① 세균성 심내막염은 치과 진료 후 잘 발생한다.
- ② 세균성 심내막염 발생시 삼첨판이 가장 많이 침범된다.
- ③ 급성 심내막염의 가장 위험한 합병증은 부정맥이다.
- ④ 심내막염 확진을 위해 관상동맥 조영술이 필수적이다.
- ⑤ 심내막염 관련 증상으로 심잡음, 관절통, 지속적인 고열이 나타난다.

39. 약물중독이 의심되는 청소년에게 가장 먼저 확인해야 할 사항은?

- ① 약 복용기간
- ② 약 복용시간
- ③ 약 복용방법
- ④ 약 구입장소
- ⑤ 약의 종류와 용량

40. 폐렴으로 고열이 나고 항생제와 해열제를 사용하고 있는 당뇨 대상자에서 인슐린 양을 증가시키지 않으면 [고혈당으로 인한 당뇨병성 케톤산증으로 진행될 위험]이 높아진다. 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 고열
- ② 해열제 사용
- ③ 항생제 사용
- ④ 인슐린 분비 감소
- ⑤ 코티졸 분비 증가